

# Ojo a la temporada de dengue <sup>[1]</sup>

Enviado el 23 junio 2008 - 7:48pm

*Este artículo es reproducido por CienciaPR con permiso de la fuente original.*

## Calificación:



Por Marga Parés Arroyo / [end.mpares@elnuevodia.com](mailto:end.mpares@elnuevodia.com) <sup>[2]</sup> [endi.com](http://endi.com) <sup>[3]</sup> Con dos fatalidades reportadas al principio de año y 11 casos sospechosos de dengue hemorrágico, inició la temporada alta de esta enfermedad, que se extiende desde junio a octubre. Hasta la fecha, se han reportado 1,345 casos sospechosos de dengue. Esta cifra es mayor a la reportada el año pasado para esta misma fecha, cuando se registraron 1,295 casos. Aunque parece haber un aumento, realmente se trata de casos remanentes de la epidemia del 2007, explicó Enid García Rivera, epidemióloga del Estado. Si se considera lo anterior, el balance real muestra una reducción de casos para el 2008, afirmó la especialista. En el 2007 se declaró una epidemia de la enfermedad, la cual afectó a 10,964 personas. Aunque la epidemia terminó en diciembre, sus remanentes se extendieron hasta marzo, recordó García. Recalcó que el número de casos sospechosos de dengue reportados este año, después del mes de marzo, ronda niveles muy por debajo de lo esperado para la época. Como ejemplo, mencionó que mientras en el 2007 se reportaron 64 casos sospechosos de dengue entre el 8 y el 14 de junio, este año, para la misma fecha, se reportaron 33. Canóvanas, Gurabo y Manatí Según el Informe Semanal de Vigilancia de Dengue que Salud realiza junto a la Subdivisión de Dengue del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), aunque aún no hay una actividad de dengue masiva en la Isla, hay tres municipios en los cuales se notó un aumento significativo durante el mes de mayo: Canóvanas, Gurabo y Manatí. Mientras en Canóvanas lo normal es que se reporten dos casos para el mes de mayo, este año se registraron siete. En Gurabo, se suele reportar uno, pero las autoridades reportaron tres. Manatí suele registrar uno, pero se detectaron cinco, según el informe. La buena noticia es que el reporte más reciente, de la semana pasada, indica que no hubo ningún caso en estos municipios. “Cuando esto ocurre hay que ver su consistencia en el aumento de casos para tomar acciones preventivas, como la inspección de los

lugares y la asperjación”, dijo García Rivera. Sin embargo, el mismo informe señala que la semana pasada se registraron 33 casos sospechosos de dengue en siete de las ocho regiones en que está dividido Puerto Rico. (Un caso de dengue se trata como “sospechoso” hasta que las pruebas de laboratorio lo confirman fuera de toda duda). Los casos en cuestión ocurrieron en las regiones de Aguadilla (2 casos), Arecibo (5), Bayamón (11), Caguas (5), Mayagüez (3), Ponce (2) y Metropolitana (5). En la región de Fajardo no se reportó ningún caso. Para minimizar el impacto de la enfermedad, García Rivera recomendó evitar la acumulación de agua, un asunto que cobra mucha importancia en esta época de verano, cuando muchas familias compran pequeñas piscinas y las dejan en sus patios. Otros focos de reproducción del mosquito que transmite el dengue son las fuentes decorativas sin motor, tiestos, neumáticos y floreros, entre otros. La peor epidemia de dengue durante los últimos 20 años continúa siendo la del 1994, cuando se reportaron 18,871 casos. Antes de esta, en 1992 otra epidemia dejó un saldo de 13,654 contagios. La del año pasado, con 10,964 afectados, es la tercera de mayor incidencia.

---

**Source URL:**<https://www.cienciapr.org/es/external-news/ojo-la-temporada-de-dengue#comment-0>

#### **Links**

[1] <https://www.cienciapr.org/es/external-news/ojo-la-temporada-de-dengue> [2]

<mailto:end.mpares@elnuevodia.com> [3]

[http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/puertoricohoy/noticias/ojo\\_a\\_la\\_temporada\\_de\\_dengue/420299](http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/puertoricohoy/noticias/ojo_a_la_temporada_de_dengue/420299)